

Nom : _____

Date de début du traitement : _____

	Considérations précédant le traitement	À l'instauration du traitement (début du 1 ^{er} mois)	Début du 2 ^e mois	Début du 3 ^e mois	Début du 4 ^e mois
Évaluation du patient (amélioration de l'acné exprimée en % par rapport à la période antérieure au traitement)		<input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 100%
Dose	<ul style="list-style-type: none"> La dose initiale de CLARUS^{MD} doit être adaptée en fonction du poids du patient et de la gravité de l'atteinte. Notons que cette période initiale est parfois accompagnée d'une exacerbation passagère de l'acné. L'administration de CLARUS^{MD} durant 12 à 16 semaines constitue un traitement complet. Veuillez consulter les renseignements d'ordonnance pour des informations complètes sur la posologie et l'administration. 	<ul style="list-style-type: none"> Instaurez le traitement à raison de 0,5 mg/kg de poids corporel durant les 2 à 4 premières semaines. Chez la femme, le traitement doit être instauré à partir du deuxième ou troisième jour du prochain cycle menstruel normal suivant un test de grossesse dont le résultat est négatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Le traitement d'entretien doit être ajusté entre 0,1 et 1 mg/kg de poids corporel par jour (jusqu'à 2 mg/kg de poids corporel par jour dans les cas exceptionnels). La dose sera fonction de la réponse du patient et de sa tolérance au médicament. Surveillez tout effet secondaire et ajustez la dose en conséquence. 	<ul style="list-style-type: none"> Le traitement d'entretien doit être ajusté entre 0,1 et 1 mg/kg de poids corporel par jour (jusqu'à 2 mg/kg de poids corporel par jour dans les cas exceptionnels). La dose sera fonction de la réponse du patient et de sa tolérance au médicament. Surveillez tout effet secondaire et ajustez la dose en conséquence. 	<ul style="list-style-type: none"> Le traitement d'entretien doit être ajusté entre 0,1 et 1 mg/kg de poids corporel par jour (jusqu'à 2 mg/kg de poids corporel par jour dans les cas exceptionnels). La dose sera fonction de la réponse du patient et de sa tolérance au médicament. Surveillez tout effet secondaire et ajustez la dose en conséquence.
Chez la femme seulement	<ul style="list-style-type: none"> Les patientes doivent utiliser sans interruption une méthode de contraception efficace pendant un mois avant de commencer le traitement à CLARUS^{MD}. Deux méthodes de contraception fiables doivent être utilisées simultanément, même par les patientes qui n'utilisent habituellement pas de moyens contraceptifs en raison d'antécédents d'infertilité ou parce qu'elles affirment ne pas être actives sexuellement ou qu'elles sont aménorrhéiques. Deux tests de grossesse sériques ou urinaires avant l'instauration du traitement par CLARUS^{MD}. Le traitement devrait commencer le deuxième ou troisième jour du prochain cycle menstruel normal suivant un test de grossesse négatif. Revoir le programme ÉCLARCI^{MC}. Aucun allaitement 	<ul style="list-style-type: none"> Les patientes doivent utiliser sans interruption une méthode de contraception efficace durant le traitement à CLARUS^{MD}. Deux méthodes de contraception fiables doivent être utilisées simultanément, même par les patientes qui n'utilisent habituellement pas de moyens contraceptifs en raison d'antécédents d'infertilité ou parce qu'elles affirment ne pas être actives sexuellement ou qu'elles sont aménorrhéiques. Le test de grossesse doit être répété chaque mois afin de révéler une grossesse durant le traitement à CLARUS^{MD}. Revoir le programme ÉCLARCI^{MC}. Aucun allaitement 	<ul style="list-style-type: none"> Les patientes doivent utiliser sans interruption une méthode de contraception efficace durant le traitement à CLARUS^{MD}. Deux méthodes de contraception fiables doivent être utilisées simultanément, même par les patientes qui n'utilisent habituellement pas de moyens contraceptifs en raison d'antécédents d'infertilité ou parce qu'elles affirment ne pas être actives sexuellement ou qu'elles sont aménorrhéiques. Le test de grossesse doit être répété chaque mois afin de révéler une grossesse durant le traitement à CLARUS^{MD}. Revoir le programme ÉCLARCI^{MC}. Aucun allaitement 	<ul style="list-style-type: none"> Les patientes doivent utiliser sans interruption une méthode de contraception efficace durant le traitement à CLARUS^{MD}. Deux méthodes de contraception fiables doivent être utilisées simultanément, même par les patientes qui n'utilisent habituellement pas de moyens contraceptifs en raison d'antécédents d'infertilité ou parce qu'elles affirment ne pas être actives sexuellement ou qu'elles sont aménorrhéiques. Le test de grossesse doit être répété chaque mois afin de révéler une grossesse durant le traitement à CLARUS^{MD}. Revoir le programme ÉCLARCI^{MC}. Aucun allaitement 	<ul style="list-style-type: none"> Les patientes doivent utiliser sans interruption une méthode de contraception efficace durant le traitement à CLARUS^{MD} et pendant un mois après l'arrêt du traitement. Deux méthodes de contraception fiables doivent être utilisées simultanément, même par les patientes qui n'utilisent habituellement pas de moyens contraceptifs en raison d'antécédents d'infertilité ou parce qu'elles affirment ne pas être actives sexuellement ou qu'elles sont aménorrhéiques. Le test de grossesse doit être répété chaque mois afin de révéler une grossesse durant le traitement à CLARUS^{MD} et un mois après l'arrêt du traitement. Revoir le programme ÉCLARCI^{MC}. Aucun allaitement
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> Ne faites pas de dons de sang. Ne partagez pas le médicament avec d'autres personnes. Ne prenez pas de tétracyclines. Ne prenez pas de suppléments de vitamine A. Utilisez un produit de protection contre le soleil. Ne prenez pas d'alcool/réduisez au minimum votre consommation d'alcool. Ne subissez pas de chirurgie esthétique pour lisser la peau. Ne prenez pas de millepertuis. 	<ul style="list-style-type: none"> Faites faire des analyses de laboratoire une semaine avant la consultation. Ne faites pas de dons de sang. Ne partagez pas le médicament avec d'autres personnes. Ne prenez pas de tétracyclines. Ne prenez pas de suppléments de vitamine A. Utilisez un produit de protection contre le soleil. Ne prenez pas d'alcool/réduisez au minimum votre consommation d'alcool. Ne subissez pas de chirurgie esthétique pour lisser la peau. Ne prenez pas de millepertuis. 	<ul style="list-style-type: none"> Faites faire des analyses de laboratoire une semaine avant la consultation. Ne faites pas de dons de sang. Ne partagez pas le médicament avec d'autres personnes. Ne prenez pas de tétracyclines. Ne prenez pas de suppléments de vitamine A. Utilisez un produit de protection contre le soleil. Ne prenez pas d'alcool/réduisez au minimum votre consommation d'alcool. Ne subissez pas de chirurgie esthétique pour lisser la peau. Ne prenez pas de millepertuis. 	<ul style="list-style-type: none"> Faites faire des analyses de laboratoire une semaine avant la consultation. Ne faites pas de dons de sang. Ne partagez pas le médicament avec d'autres personnes. Ne prenez pas de tétracyclines. Ne prenez pas de suppléments de vitamine A. Utilisez un produit de protection contre le soleil. Ne prenez pas d'alcool/réduisez au minimum votre consommation d'alcool. Ne subissez pas de chirurgie esthétique pour lisser la peau. Ne prenez pas de millepertuis. 	<ul style="list-style-type: none"> Faites faire des analyses de laboratoire une semaine avant la consultation. Ne faites pas de dons de sang durant ce mois-ci ni durant le mois suivant l'arrêt du traitement à CLARUS^{MD}. Ne partagez pas le médicament avec d'autres personnes. Ne prenez pas de tétracyclines. Ne prenez pas de suppléments de vitamine A. Utilisez un produit de protection contre le soleil. Ne prenez pas d'alcool/réduisez au minimum votre consommation d'alcool. Ne subissez pas de chirurgie esthétique pour lisser la peau. Ne prenez pas de millepertuis.
Analyses de sang	<p>Formule sanguine complète</p> <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Glycémie (diabétiques) <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Test de grossesse sérique ou urinaire <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif Lipides Triglycérides ¹ <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Cholestérol <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale HDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale LDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale (Les anomalies touchant les triglycérides sériques, le HDL et le cholestérol étaient réversibles à la cessation du traitement à CLARUS ^{MD}) Fonction hépatique ALT <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale AST <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Alk. Phos. <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale	<p>Formule sanguine complète</p> <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Glycémie (diabétiques) <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Test de grossesse sérique ou urinaire <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif Lipides Triglycérides ¹ <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Cholestérol <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale HDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale LDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Fonction hépatique ALT <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale AST <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Alk. Phos. <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale	<p>Formule sanguine complète</p> <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Glycémie (diabétiques) <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Test de grossesse sérique ou urinaire <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif Lipides Triglycérides ¹ <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Cholestérol <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale HDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale LDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Fonction hépatique ALT <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale AST <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Alk. Phos. <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale	<p>Formule sanguine complète</p> <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Glycémie (diabétiques) <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Test de grossesse sérique ou urinaire <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif Lipides Triglycérides ¹ <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Cholestérol <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale HDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale LDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Fonction hépatique ALT <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale AST <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Alk. Phos. <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale	<p>Formule sanguine complète</p> <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Glycémie (diabétiques) <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Test de grossesse sérique ou urinaire <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Positif Lipides Triglycérides ¹ <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Cholestérol <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale HDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale LDL <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Fonction hépatique ALT <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale AST <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale Alk. Phos. <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Anormale
Prise en charge des effets secondaires incommodes	Consultation sur les effets secondaires Effets secondaires courants* <input type="checkbox"/> Poussées d'acné <input type="checkbox"/> Lèvres gerçées <input type="checkbox"/> Sécheresse de la muqueuse nasale <input type="checkbox"/> Sécheresse ou démangeaisons cutanées <input type="checkbox"/> Sécheresse oculaire <input type="checkbox"/> Arthralgie <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Autre : _____ <input type="checkbox"/> Autre : _____	Consultation sur les effets secondaires Effets secondaires courants* <input type="checkbox"/> Poussées d'acné <input type="checkbox"/> Lèvres gerçées <input type="checkbox"/> Sécheresse de la muqueuse nasale <input type="checkbox"/> Sécheresse ou démangeaisons cutanées <input type="checkbox"/> Sécheresse oculaire <input type="checkbox"/> Arthralgie <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Autre : _____ <input type="checkbox"/> Autre : _____	Consultation sur les effets secondaires Effets secondaires courants* <input type="checkbox"/> Poussées d'acné <input type="checkbox"/> Lèvres gerçées <input type="checkbox"/> Sécheresse de la muqueuse nasale <input type="checkbox"/> Sécheresse ou démangeaisons cutanées <input type="checkbox"/> Sécheresse oculaire <input type="checkbox"/> Arthralgie <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Autre : _____ <input type="checkbox"/> Autre : _____	Consultation sur les effets secondaires Effets secondaires courants* <input type="checkbox"/> Poussées d'acné <input type="checkbox"/> Lèvres gerçées <input type="checkbox"/> Sécheresse de la muqueuse nasale <input type="checkbox"/> Sécheresse ou démangeaisons cutanées <input type="checkbox"/> Sécheresse oculaire <input type="checkbox"/> Arthralgie <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Autre : _____ <input type="checkbox"/> Autre : _____	Consultation sur les effets secondaires Effets secondaires courants* <input type="checkbox"/> Poussées d'acné <input type="checkbox"/> Lèvres gerçées <input type="checkbox"/> Sécheresse de la muqueuse nasale <input type="checkbox"/> Sécheresse ou démangeaisons cutanées <input type="checkbox"/> Sécheresse oculaire <input type="checkbox"/> Arthralgie <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Autre : _____ <input type="checkbox"/> Autre : _____
Traitement suggérés des effets secondaires incommodes	<ul style="list-style-type: none"> Les poussées d'acné sont habituellement passagères Lèvres gerçées : appliquer un produit à base de pétrolatum tel que Vaseline^{MC} Sécheresse de la muqueuse nasale : appliquer un lubrifiant nasal tel que le gel Secaris[®] Sécheresse ou démangeaisons cutanées : appliquer un hydratant à base d'eau tel que Cetaphil[®] 	<ul style="list-style-type: none"> Sécheresse oculaire : utiliser des larmes artificielles telles que Tears Naturele[®] Arthralgie : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS Tendinite : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS 	<ul style="list-style-type: none"> Sécheresse oculaire : utiliser des larmes artificielles telles que Tears Naturele[®] Arthralgie : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS Tendinite : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS 	<ul style="list-style-type: none"> Sécheresse oculaire : utiliser des larmes artificielles telles que Tears Naturele[®] Arthralgie : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS Tendinite : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS 	<ul style="list-style-type: none"> Sécheresse oculaire : utiliser des larmes artificielles telles que Tears Naturele[®] Arthralgie : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS Tendinite : traiter au moyen de l'acétaminophène ou d'un AINS
Autres considérations	Questions à poser aux patients Sautes d'humeur? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dépression? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Questions à poser aux patients Sautes d'humeur? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dépression? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Questions à poser aux patients Sautes d'humeur? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dépression? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Questions à poser aux patients Sautes d'humeur? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dépression? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Questions à poser aux patients Sautes d'humeur? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dépression? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

CLARUS^{MD} est une marque déposée de Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatris.

VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques de commerce de Mylan Inc., utilisées avec permission par Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatris.

©2022 Viatris Inc. Tous droits réservés.